

Infúzna terapia vysokými dávkami vitamínu C

270 €

Vitamín C sa podieľa na mnohých procesoch v ľudskom organizme. Ak ho telo nedostáva v dostatočnom množstve, dochádza k prejavom jeho nedostatku. Infúzie s vitamínom C predstavujú jednu z možností, ako telu dodať tento vitamín vo vysokých dávkach a tým jeho nedostatok vyrovnať.

Účinky:

- zlepšuje obranyschopnosť proti infekciám, podporuje imunitu
- má protizápalový účinok
- je dôležitý pre celý imunitný systém
- je nevyhnutný pre hojenie rán a rýchlejšiu rekonvalescenciu
- asistuje pri tvorbe kolagénu a kĺbového mazu
- chráni nervy a cievy pred srdcovo – cievnyimi chorobami
- znižuje cholesterol
- vhodný pre ľudí s chronickým únavovým syndrómom
- priaznivo pôsobí pri vysokom tlaku
- vhodný pri zvýšenej telesnej záťaži
- vhodné je ho dopĺňať aj preventívne /hlavne fajčiari, ľudia s chronickými ochoreniami a starší ľudia/

repcia@klinikamd.sk

Pred podaním prvej dávky je klientovi vykonané vyšetrenie/konzultácia u všeobecného lekára alebo internistu polikliniky. Klient následne absolvuje 5 podaní s odstupom 1 x za týždeň. Trvanie 1 terapie v odberovej miestnosti je cca 60 min.

Pred zakúpením balíka terapií si prosím preštudujte informácie nižšie. Ďakujeme.

Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Vitamin C Injektapas 7,5 g

Nepoužívajte Vitamin C-Injektapas 7,5 g

- ak ste alergický na kyselinu askorbovú alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
- ak máte obličkové kamene alebo máte sklon k vzniku obličkových kameňov
- ak máte nedostatočnú funkciu obličiek
- ak trpíte ochorením, spojeným s nadmerným hromadením železa v tele (talasémia, hemochromatóza, sideroplastická anémia)

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Vitamin C-Injektapas, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.

Vnútrožilové podanie vysokých dávok Vitamínu C-Injektapas môže spôsobiť vznik obličkových kameňov a s ním súvisiace náhle zlyhanie obličiek. Zvlášť náchylní sú pacienti s už existujúcou poruchou funkcie obličiek. Má sa zabezpečiť dostatočný príjem tekutín (približne 1,5-2 litre denne).

Pacienti s opakovanou tvorbou obličkových kameňov nesmú dostávať viac ako 100 až 200mg vitamínu C za deň. Pacienti so závažným alebo konečným obličkovým zlyhaním (dialyzovaní pacienti) nesmú dostať viac ako 50 až 100mg vitamínu C za deň.

U pacientov s nedostatkom enzýmu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy (dedičné metabolické ochorenie červených krviniek) sa v ojedinelých prípadoch vyskytla ťažká hemolýza (rozpad červených krviniek) pri podaní vysokých dávok vitamínu C (viac ako 4g za deň). Preto sa denná dávka 100 až 500mg kyseliny askorbovej nemá prekračovať.

Pacientom so známym pľúcnym ochorením (napr. obštrukčné a reštrikčné bronchiálne a pľúcne ochorenie) sa môžu podávať dávky len do 7,5g kyseliny askorbovej za deň, keďže vyššie dávky môžu viesť k náhlej dýchavičnosti. Odporúča sa začať liečbu s nízkymi dávkami vitamínu C.

Podávanie vysokých dávok vitamínu C v infúzii môže ovplyvňovať niektoré biochemické vyšetrenia.

U alergických osôb môžu pri používaní tohto lieku vzniknúť kožné reakcie až astmatický záchvat.

U novorodencov, ktorých matky užívali vysoké dávky vitamínu C sa môžu vyskytnúť prejavy skorbutu (príznaky zahŕňajú: dlhodobu zníženú energiu, krvácanie z ďasien, bolesť kostí a kĺbov, častejší výskyt modrín, pomalšie hojenie drobných rán, možná chudokrvnosť) alebo syndróm z vysadenia. Podobné prejavy skorbutu sa môžu vyskytnúť u ľudí, ktorí náhle prestali užívať vysoké dávky kyseliny askorbovej.

Informácia pre diabetikov:

Po podaní vysokých dávok Vitamin C-Injektapas môžu hladiny liečiva v krvi dosiahnuť také hodnoty, že môžu ovplyvniť testy na stanovenie glukózy v krvi.

Iné lieky a Vitamin C-Injektapas 7,5 g

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Vitamin C-Injektapas môže ovplyvňovať účinok mnohých súbežne užívaných liekov. Informujte svojho lekára ak užívate:

- antikoagulantia (kumarínové deriváty – lieky proti zrážaniu krvi)
- kyselinu acetylsalicylovú (liek pri tvorbe krvných zrazenín, protizápalový liek)

Vysoké dávky kyseliny askorbovej sa majú podávať s odstupom po chemoterapeutických látkach (na liečbu nádorových ochorení, 1-3 dni neskôr).

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Denná dávka 100 až 500mg kyseliny askorbovej sa nesmie prekročiť, ak ste tehotná alebo dojčíte.

Kyselina askorbová sa prestupuje cez placentu a vylučuje do materského mlieka.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie je známe ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Vitamin C-Injektapas 7,5 g obsahuje sodík

Tento liek obsahuje 42,3mmol (972mg) sodíka v 50ml infúzneho roztoku (jedna liekovka). Má sa vziať do úvahy u pacientov so zníženou funkciou obličiek alebo u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka.